

INFORMATIONS TECHNIQUES

Quelques facteurs de la production cotonnière en République Centrafricaine

I

La culture cotonnière est réalisée en Centrafrique selon plusieurs méthodes :

— culture motorisée ;

— culture à traction animale (ou culture « attelée ») ;

— culture manuelle avec engrais et insecticides (programme A) ;

— culture manuelle avec insecticides (programme B) ;

— culture manuelle sans engrais ni insecticide.

Bien entendu, les deux premières méthodes comprennent engrais et insecticides.

L'importance relative de chacune de ces méthodes, par sous-préfecture, ressort des chiffres ci-dessous :

Sous-préfecture	Nombre de planteurs	Surface en cotonnier	Importance de chaque type de culture								Production coton-graine
			Motorisée		Attelée		Manuelle A		Manuelle B		
			1967	1967	1966	1967	1966	1967	1966	1967	1966
		ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	t
M'BOMOU	25 638	10 906									1 656
RAFAL	4 101	1 462						190		90	239
BAKOUMA	3 070	1 508								50	240
BANGASSOU	10 856	4 709								309	804
OUANGO	7 611	3 227									373
BASSE KOTTO	30 062	13 314									3 144
KEMBÉ	3 182	1 379					2	33	45	479	391
MOBAYE	8 893	3 996					1	75	110	425	430
MINGALA	5 668	2 708				13	6	209		678	829
ALINDAO	12 319	5 231	20	25	77	196	273	354	276	487	1 494
OUAKA		30 017									13 642
BAMBARI	23 821	10 382	243	322	161	211	300	495	195	1 070	4 393
BAKALA	4 500	2 088		149		31		271		314	553
IPPY	—	5 539		125		34		117		141	2 235
GRIMARI	10 687	5 725	693	752	7	16	286	817	156	770	3 048
KOUANGO	—	6 283		350		13		236		1 080	3 413
KEMO-GRIBINGUI		17 547									5 190
FORT SIRUT	10 248	5 200	135	186	25	74	167	298	322	592	1 535
DEROA	7 700	3 980			14	56	149	488	260	1 031	1 500
FORT CRAMPEL	—	8 367			166	244	428	766	433	1 800	2 155
OUHAM	58 971	31 430									7 070
BOSSANGOA	30 527	16 677			273	454	3	1	97	85	3 428
MARKOUNDA	7 595	4 026			39	145	11	96	82	66	1 318
BATANGAFO	11 586	6 237			4	22	14	45		29	1 569
BOUCA	9 263	4 470			2	3	1	18		136	755
OUHAM-PENDE	58 108	28 230									8 626
PAOUA	25 403	13 053		209	24	85	86	87	47	44	4 215
BOCARANGA	21 628	10 236			3	3	50	155	50	56	3 044
BOZOUUM	11 077	4 941			70	110	50	56		11	1 367
NANA-MAMBERE	9 289	4 182									152
BODAR	5 306	2 574								238	45
BABOUA	3 983	1 608				8		100		139	107
Total	225 568 (1)	135 626	1 091	2 118	865	1 718	1 827	4 907	1 873	10 120	39 480

(1) 182 568 plus les estimations pour IPPY (15 000), KOUANGO (12 000) et FORT-CRAMPEL (16 500).

Prévisions pour 1968 quant aux opérations de « productivité » :

Programme A : engrais + insecticides .. 15 895 ha

Programme B : insecticides 13 630 ha

Total 29 525 ha

soit 25 à 30 % de la surface totale en cotonnier.

II

Variétés cultivées et production de coton-graine :

Sous-préfectures	Variétés et superficies 1967 (ha)							Production coton- graine t
	Banda	D 9	A 150	Allen A 151	A 333	Réba B 50	BJA 592	
RAFAY		693				769		
BAKOUA		1 508						
BANGASSOU	2 965	1 744						
OUANGO		3 227						
KEMBÉ		1 379						
MOBAYE		3 296				700		
MINGALA						2 703		
ALINDAO		3 210				1 996	25	
BAMBARI						9 965	417	
BAKALA						2 088		
IPPY						5 539		
GRIMARI						5 173		
KOUANGO						6 283	336	
FORT-SIBUT						5 200		
DÉKO						3 900		
FORT-CRAMEL						7 937	430	
BOSSANGO					16 657		20	
MARKOUNDA					4 026			
BATANGAO			4 407		1 850			
BOUCA (1)					1 400			
PAOUA					13 028		25	
BOCARANGA					10 236			
BOZOU					4 941			
BOUAR				2 535	39			
BABOUA					1 608			
Total	2 965	15 057	4 407	2 535	53 785	52 258	1 253	

(1) A BOUCA, on a encore cultivé en 1967 : 3 070 ha de la variété Soumbé A 25 B 9.